



Circolare n° 58

ISTITUTO COMPRENSIVO-RECALE  
Prot. 0004916 del 05/12/2023  
IV-8 (Uscita)

Ai Docenti dell'I.C. "Giovanni XXIII"  
e loro tramite alle Famiglie degli alunni  
AL Registro Elettronico  
e p.c. Al D.S.G.A.  
ATTI /ALBO / SITO WEB

Oggetto: Pediculosi – Comunicazione e misure di prevenzione e profilassi –

Al fine di prevenire casi di pediculosi all'interno dell'Istituto, si invitano i genitori a controllare i propri figli e seguire le informazioni seguenti.

Il pidocchio della testa è un parassita che vive di sangue umano, vicino al cuoio capelluto (lontano dal corpo vive al massimo due-tre giorni). Le sue uova si chiamano lendini e vengono fissate al capello. Il pidocchio non vola e non salta, ma si contagia per contatto diretto o tramite spazzole, pettini, cappelli. Il sintomo iniziale è il prurito associato a grattamento. Quando un familiare viene contagiato devono essere controllati tutti i componenti della famiglia.

<b>Periodo di incubazione</b>	In condizioni ottimali per il ciclo vitale dei pidocchi, da 6 a 10 giorni in caso di infestazione con uova.
<b>Periodo di contagiosità</b>	<b>Fintanto che uova, forme larvali o adulte sono presenti e vitali sulle persone infestate o su indumenti.</b>
<b>Provvedimenti da adottare</b>	<u>In caso di infestazione da contatto isolamento per non meno di 24 ore dall'inizio di un adeguato trattamento disinfestante.</u> Il trattamento disinfestante consiste nell'applicazione di polvere di talco contenente DDT al 10% oppure Malathion all'1% oppure permetrina allo 0,5% o altri insetticidi. Gli indumenti vanno trattati con gli stessi composti applicati sulle superfici interne oppure lavati con acqua bollente. <b>Restrizione della frequenza di collettività fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante.</b> Il trattamento disinfestante, consistente in applicazione di shampoo medicati contenenti permetrina all'1% o piretrine associate a piperonilbutossido, o benzilbenzoato o altri insetticidi, deve essere periodicamente ripetuto ogni 7-10 giorni per almeno un mese. <u>Pettini e spazzole vanno immersi in acqua calda per 10 minuti e/o lavati con shampoo antiparassitario.</u>
<b>Provvedimenti nei confronti di conviventi e di contatti</b>	Sorveglianza sanitaria per l'identificazione di altri casi di parassitosi, e conseguente trattamento disinfestante.

Si rammenta inoltre che la normativa vigente (circolare Ministeriale della Sanità n.4 del 13/03/1998) stabilisce la sospensione della frequenza scolastica dei soggetti affetti da pediculosi, fino all'avvio di un idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta).



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RECALE

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado

Viale Europa 3 Recale - CE



*Ministero dell'Istruzione*

Il Dirigente Scolastico quindi può disporre l'allontanamento obbligatorio dell'alunno affetto da pediculosi, o in caso di dubbio sulla effettiva presenza dell'infestazione, può richiedere una visita del medico curante che rilascerà una idonea certificazione attestante o l'assenza dell'infestazione o l'avvenuto trattamento.

Si confida nella collaborazione di tutti i soggetti interessati e si invitano i docenti a dare la massima diffusione tra gli alunni della presente comunicazione per la necessaria informazione alle famiglie. La stessa viene pubblicata sul sito Internet della scuola.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Matriona De Matteis  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93